



FICHA TÉCNICA

AGUACATE HASS

El aguacate Hass es originario de Guatemala, producto de una mezcla de razas de aguacate guatemaltecas y mexicanas, lo cual, permite producir un fruto de alta calidad, con un alto contenido de aceites y excelente sabor.

Nombre Científico

Persea americana Mill

Origen de la Producción

Cantón Chipacá Primero, Chichicastenango, El Quiché, Guatemala, C.A.

Características fisicoquímicas

(% materia seca) mercado nacional y de exportación

Mínimo	27%	Máximo	28%
Mínimo	22%	Máximo	23%

Características Organolépticas



Uniforme



Libre de sabores extraños



Libre de olores extraños



Oval, de superficie lisa o rugosa

Criterios de Calidad

Para el momento del empaque, se tendrán en cuenta las siguientes características:

Defectos sin tolerancia

- Ausencia de pedúnculo	- Presencia de excreta de aves	- Daños mecánicos que comprometan la pulpa
- Daños por plagas como Monalonion sp, Stenoma sp, Heilipus sp, Marceños (escarabajos)	- Hongo en el pedúnculo	- Daños por enfermedades como Antracnosis, Fumagina y otras.
- Fruta con signos de maduración	- Roce excesivo (lenticelosis)	- Fruta con % materia seca baja
- Fruta con tierra	- Fruta con presencia de plagas	- Fruta con residuos de tratamiento
	- Mordedura de roedores	
	- Daño por heladas	

Defectos mayores

(máximo 2% por caja)

- Golpe de sol menor al 10% de la superficie de la cáscara	- Cicatrices menores a 2 cm ²
- Deformación mínima	- Defectos menores (máximo 10% por caja)
- Roce muy leve	- Thrips, daños no muy pronunciados
- Rose no muy pronunciado	

Embalaje

(mercado nacional)

Cajas plásticas c/las medidas	Tamaño del fruto, circunferencia vertical (cm)			
55*37.5*32 cm.	Super:	Extra:	Primera:	Comercial:
Capacidad en libras	35	30	25	20
50	Peso del fruto (gramos)			
O según requerimiento de los clientes en empaque	Super:	Extra:	Primera:	Comercial:
	301 a 330	194 a 300	161 a 170	140 a 160

Datos de Producción

7 hectáreas

Área cultivada

2,688

Árboles en producción

5,376

Volumen total de producto esperado en quintales

Agosto - Septiembre
(floración loca)

Temporada de producción

Enero - Febrero

Temporada de producción normal



Coinachi R.L.



Coinachi R.L.